

Más información

SALUD RESPONDE
902 505 060



www.ehppo.es



Empresa Pública Hospital de Poniente
CONSEJERÍA DE SALUD


Andalucía
al máximo

Recomendaciones para Intervenciones de Vasectomía.

Operación de vasectomía (Vasectomy Surgery)



1. Se hace un pequeño corte en la piel del escroto.



2. Se extrae el vas a través de la apertura.



3. El vas se corta y se sellan ambos extremos.




4. Los extremos se vuelven a colocar en el escroto y se cierra el corte.




Empresa Pública Hospital de Poniente
CONSEJERÍA DE SALUD

Operación de vasectomía (Vasectomy Surgery)



Mediante la inyección de un anestésico local se consigue un grado satisfactorio de anestesia para la intervención. Localizado el conducto deferente, se realiza una pequeña incisión de la piel para permitir seccionar este conducto. La intervención se realiza en ambos lados.



Al estar interrumpido el paso de espermatozoides por el conducto deferente. El semen del eyaculado carecerá de estos y Usted será infértil.

Recomendaciones para Intervención de Vasectomía

Acudirá al área quirúrgica de este Hospital a la hora y fecha señalada, no siendo preciso el ayuno previo, aunque es preferible una ingesta previa no voluminosa.

Es preciso el Rasurado (Afeitado del vello escrotal) para evitar infecciones. Lo realizará en su domicilio previamente a acudir al Hospital, así mismo se deberá duchar.

Después de la intervención no debe conducir. Intente venir acompañado. Este procedimiento se realiza con anestesia local y ambulatoriamente, la duración habitual es de 20 minutos. Se realiza una pequeña incisión a ambos lados, buscando los conductos deferentes que se seccionan para interrumpir el paso de los espermatozoides.

Al terminar deberá acudir a su domicilio y permanecer en reposo durante 2 ó 3 días.

Tomará analgesia recomendada en su informe de alta. El reposo postoperatorio es fundamental para evitar complicaciones. Deberá estar tumbado las primeras 8 horas y durante 24 horas más reposo en domicilio. Los apósitos de las heridas se retirarán al día siguiente y se curará con solución de Yodo durante 2-3 días. Después no es preciso tapar las heridas, solo lavado con agua y jabón.

Debe realizar Análisis de Semen pasado 4 meses. Esta prueba es fundamental e imprescindible para confirmar la ausencia de Espermatozoides en su líquido seminal.